

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:

Es peligroso excederse de las dosis recomendadas.

Butocort Aerosol para Inhalación es apropiado para la terapéutica de rutina prolongada, pero no para tratar ataques agudos. En consecuencia, algunos pacientes requerirán el uso adicional de broncodilatadores para mejorar el broncoespasmo agudo.

Si el efecto de terapias broncodilatadoras adicionales, o la mejoría provista por **Butocort Aerosol para Inhalación** duran menos de 4 horas, el paciente debe estar advertido para concurrir al médico.

Es necesario tener especial cuidado en pacientes con tuberculosis pulmonar activa o latente. **Butocort Aerosol para Inhalación** no debe administrarse habitualmente con drogas beta-bloqueantes no selectivas, tales como el propranolol.

Butocort Aerosol para Inhalación deberá ser administrado con cautela en pacientes que presentes tirotoxicosis.

Embarazo

Es aconsejable que se evite la administración innecesaria de drogas durante el primer trimestre del embarazo.

Interacciones

Usar con extrema precaución en enfermos sometidos a IMAO o antidepresivos tricíclicos. Bloqueantes beta receptores y salbutamol se inhiben mutuamente.

REACCIONES ADVERSAS

La candidiasis de boca y garganta se presenta en algunos pacientes que inhalan beclometasona dipropionato. Los enfermos con elevados niveles en sangre de precipitinas de Cándida que indican una infección previa, son más propensos a desarrollar esta complicación. En algunos pacientes la inhalación de beclometasona dipropionato puede causar ronquera o irritación de garganta. En ambos casos puede ser de utilidad que se enjuague la boca con agua luego de la utilización del aerosol. Con la utilización de salbutamol en aerosol la aparición de reacciones de hipersensibilidad, incluido el angioedema, la urticaria, broncoespasmo, hipotensión y colapso han sido muy raras. Como sucede con otras terapias por inhalación se debe tener presente la posibilidad de que se produzcan broncoespasmos paradójales. En este caso el producto debe ser inmediatamente discontinuado e instituirse una terapia alternativa.

CONTRAINDICACIONES

Butocort Aerosol para Inhalación está contraindicado en pacientes con historia de hipersensibilidad a cualquiera de sus componentes

Es muy importante la higiene del adaptador bucal.

Lea atentamente “MODO DE EMPLEO” e “HIGIENE DEL ADAPTADOR BUCAL”.

MODO DE EMPLEO:

Antes de utilizar este inhalador lea este folleto y siga las instrucciones:

1. Quite la tapa del adaptador bucal (ver figura 1).
2. Agite el envase (ver figura 2).
3. Expire lo más profundamente posible.
4. Coloque el extremo libre del adaptador bucal en la boca, apretando los labios alrededor (ver figura 3). Mantenga el aparato como se indica, no olvidando que el envase debe usarse con la base hacia arriba.
5. Inspire profunda y fuertemente e inmediatamente al comienzo de la inspiración presione una vez y fuertemente el fondo del envase.
6. Retenga la respiración algunos segundos, después sacar el tubo de la boca y expulse lentamente el aire.

Este proceso corresponde a la aplicación de una dosis.

Repetir según indicación médica.

La dosis debe ser liberada en el momento exacto de la inspiración profunda. Si carecen de fuerza, deben emplear ambas manos para presionar el envase.

IMPORTANTE:

Puede ser que su médico le haya indicado otra forma para usar el inhalador, por ejemplo usando un espaciador o aerocámara. En este caso, siga sus instrucciones.

Los niños deben ser ejercitados y ayudados por un adulto para un correcto uso del medicamento

La dosis debe ser liberada en el momento exacto de la inspiración profunda. Si carecen de fuerza, deben emplear ambas manos para presionar el envase.




FIGURA 1




FIGURA 2



FIGURA 3

HIGIENE DEL ADAPTADOR BUCAL

Es muy importante la higiene del adaptador bucal.

Si no se realiza una limpieza adecuada el inhalador puede no emitir dosis.

Cuando la medicación que sale es poca o nula (ver figura A), es porque el inhalador se ha tapado, entonces debe lavarse el adaptador como se indica en los pasos 1 y 2.




Figura A

Lave semanalmente el adaptador bucal.

No trate de desobstruir con objetos puntiagudos tales como un alfiler.


Siga las siguientes instrucciones:

Paso 1. Quite el envase metálico y la tapa del adaptador. Lave de arriba hacia abajo, de un lado y del otro del adaptador, con agua tibia durante 30 segundos al menos una vez a la semana (ver figura B).

No sumergir el envase metálico en el agua.

Paso 2. Sacudir y dejar secar al aire libre, por ejemplo durante la noche o descanso (ver figura C).

La acumulación de medicamento se produce con más frecuencia si el adaptador bucal no se seca al aire libre.



Paso 1 - Figura B

Paso 2 - Figura C

Cuando el adaptador bucal esté seco, colocar el envase metálico y la tapa (ver figura D).

Si necesitara usar el inhalador antes de que éste se seque completamente al aire, sacudir el exceso de agua, colocar el envase metálico y pulsar el inhalador dos veces al aire lejos del rostro, a fines de arrastrar el resto de agua. Administrar la dosis y luego lavar nuevamente y secar según los pasos 1 y 2.




Figura D

DISPARO DE PRUEBA

Como todos los aerosoles de uso médico, es una sabia precaución hacer un disparo de prueba al aire antes de usarlo por primera vez, y en cada ocasión en que el aerosol permanezca sin uso durante una semana o más.

CONDICIONES DE CONSERVACIÓN Y ALMACENAMIENTO:

Conservar a temperatura ambiente a no más de 30 °C.

El contenido está bajo presión.

No arrojar al fuego ni al incinerador.

No perforar.

Mantener fuera del alcance de los niños.

PRESENTACIÓN

Envase x 250 Dosis

**NO REPITA EL TRATAMIENTO SIN INDICACION MEDICA
NO RECOMIENDE ESTE MEDICAMENTO A OTRA PERONA**

LABORATORIO D&M PHARMA LTDA.